

## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016

E.3.Χλ3Θ(α)

**ΤΑΞΗ:** Γ' ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

**ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ:** ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

**ΜΑΘΗΜΑ:** ΧΗΜΕΙΑ

**Ημερομηνία:** Κυριακή 17 Απριλίου 2016

**Διάρκεια Εξέτασης:** 3 ώρες

### ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

#### ΘΕΜΑ Α

- A.1 α
- A.2 γ
- A.3 γ
- A.4 δ

Ο αριθμός των ηλεκτρονίων με  $n+l=4$  είναι ίσος με 8 (υποστοιβάδες 3p και 4s) για όλα τα άτομα που έχουν  $Z > 19$ , αφού έχουν συμπληρωθεί αυτές οι υποστοιβάδες. Έτσι, δεν απαιτείται η συμπλήρωση της δομής του στοιχείου για να επιλέξει τη σωστή απάντηση.

- A.5 α

#### ΘΕΜΑ Β

- B.1 α-Σ, β-Λ, γ-Λ, δ-Λ, ε-Σ
- B.2 α Η ένωση A έχει γενικό τύπο  $C_vH_{2v+1}COOH$  με  $v \geq 0$ .

Επειδή δεν οξειδώνεται, δεν είναι το HCOOH, άρα θα είναι  $v \geq 1$ . Η ένωση B δίνει την αλογονοφορμική αντίδραση, οπότε είναι της μορφής:



Επειδή κατά τη θέρμανση της B παρουσία χαλκού, παράγεται καρβονυλική ένωση που δεν ανάγει το αντιδραστήριο Tollens, δηλαδή κετόνη, θα είναι τελικά  $\mu \geq 1$

Η ένωση Γ είναι της μορφής  $C_vH_{2v+1}COOCH(CH_3)C_\mu H_{2\mu+1}$  και έχει πέντε άτομα άνθρακα, αφού έχει μοριακό τύπο  $C_5H_{10}O_2$  και προκύπτει η σχέση:  $v+1+2+\mu=5 \Rightarrow v+\mu=2$




Με βάση τα παραπάνω προκύπτει  $v=\mu=1$  και προκύπτουν οι συντακτικοί τύποι:




Οι χημικές εξισώσεις των αντιδράσεων που πραγματοποιούνται, είναι:

## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016

E.3.Χλ3Θ(α)



**β.** Με την προσθήκη αφυδατικού μέσου στην ισορροπία:



ελαττώνεται η συγκέντρωση του νερού και σύμφωνα με την αρχή

Le Chatelier η χημική ισορροπία μετατοπίζεται προς την κατεύθυνση που παράγεται νερό, δηλαδή προς τα δεξιά, όπότε αυξάνει την απόδοση της παρασκευής του εστέρα.

### B.3 α. Διάλυμα $\Delta_1$



Επειδή το pH του διαλύματος είναι 7, πρέπει και το ιόν  $\text{A}^-$  να αντιδρά με το νερό, σύμφωνα με τη χημική εξίσωση:  $\text{A}^- + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{HA} + \text{OH}^-$ .

Επίσης πρέπει να ισχύει  $K_{b(\text{A}^-)} = K_a(\text{NH}_4^+) = 10^{-9}$  ώστε  $[\text{OH}^-] = [\text{H}_3\text{O}^+]$ .

Επομένως το οξύ HA είναι ασθενές οξύ με  $K_a = 10^{-5}$

### Διάλυμα $\Delta_2$

Έστω n mol η ποσότητα του NaOH που περιέχεται στον όγκο των V ml. Επομένως στον όγκο των 2Vml περιέχονται 2n mol NaOH. Αφού παρατηρείται η αλλαγή χρώματος του διαλύματος κατά την προσθήκη των 2Vml διαλύματος NaOH θα ισχύει:

$$n_{\text{HB}} = n_{\text{NaOH}} = 2n \text{ mol}$$

Τη στιγμή που έχουμε προσθέσει Vml του πρότυπου διαλύματος NaOH στο διάλυμα ( $\Delta_2$ ) του οξέος HB έχουμε:

	mol	HB	+	NaOH	→	NaB	+	H <sub>2</sub> O
αρχικά	2n			n				
Αντ/παρ	- n			- n				
τελικά	n			0				n

Δηλαδή έχουμε ρυθμιστικό διάλυμα HB, NaB του οποίου τα συστατικά έχουν ίσα mol, άρα και ίσες συγκεντρώσεις. Επομένως  $\text{pH} = \text{pK}_a(\text{HB})$  ή  $K_a(\text{HB}) = 10^{-4}$ .

Έτσι ισχύει  $K_a(\text{HB}) > K_a(\text{HA})$  οπότε το οξύ HB είναι ισχυρότερο.

## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016

E.3.Χλ3Θ(α)

**β)  $K_a(HA) < K_a(HB)$  ή  $K_b(A^-) > K_b(B^-)$ .**

Αφού τα διαλύματα έχουν την ίδια συγκέντρωση, οι βάσεις  $A^-$ ,  $B^-$  είναι μονοπρωτικές και  $K_b(A^-) > K_b(B^-)$  ισχύει:  $[OH^-]_{A^-} > [OH^-]_{B^-}$  οπότε

$$pH_{NaA} > pH_{NaB}.$$

**B.4 α.** Το στοιχείο  $^{34}\Sigma_1$  έχει ηλεκτρονική δομή:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^4$  και ανήκει στην 4<sup>η</sup> περίοδο και 16<sup>η</sup> ομάδα.

Έστω  $Z_1$ ,  $Z_2$  και  $Z_3$  οι ατομικοί αριθμοί των στοιχείων  $\Sigma_1$ ,  $\Sigma_2$  και  $\Sigma_3$  αντίστοιχα. Αφού ο ατομικός αριθμός του  $\Sigma_2$  διαφέρει από αυτόν του  $\Sigma_1$  κατά 3, θα διακρίνουμε περιπτώσεις:

Αν ισχύει ότι  $Z_2 = Z_1 + 3 = 34 + 3 = 37$ , το στοιχείο  $\Sigma_2$  θα έχει την ηλεκτρονιακή δόμηση:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^6 5s^1$  και ανήκει στην 5<sup>η</sup> περίοδο. Η περίπτωση αυτή απορρίπτεται, γιατί το  $\Sigma_2$  ανήκει σε διαφορετική περίοδο από το  $\Sigma_1$ .

Άρα θα ισχύει:  $Z_2 = Z_1 - 3 = 34 - 3 = 31$  και το  $\Sigma_2$  θα έχει την ηλεκτρονιακή δόμηση:  $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^{10} 4s^2 4p^4$  οπότε ανήκει στην 4<sup>η</sup> περίοδο και στην 13<sup>η</sup> ομάδα.

Αφού το  $\Sigma_3$  ανήκει στην ίδια ομάδα με το  $\Sigma_1$ , θα ανήκει στη 16<sup>η</sup> ομάδα και επειδή έχει τη μικρότερη ατομική ακτίνα από όλα τα στοιχεία της ομάδας αυτής, θα ανήκει στη 2<sup>η</sup> περίοδο. Αυτό συμβαίνει γιατί σε μια ομάδα του περιοδικού πίνακα η ατομική ακτίνα ελαττώνεται από κάτω προς τα πάνω, αφού ελαττώνεται ο αριθμός των στιβάδων των στοιχείων της ομάδας.

Με βάση τα παραπάνω, το  $\Sigma_2$  θα έχει δύο στιβάδες και δομή τελευταίου ηλεκτρονίου  $2p^4$  αφού ανήκει στη 16<sup>η</sup> ομάδα και η ηλεκτρονιακή του δομή είναι:  $1s^2 2s^2 2p^4$  οπότε  $Z_3 = 8$ .

Συνοπτικά, έχουμε:  $Z_2 = 31$  και  $Z_3 = 8$

Το  $\Sigma_1$  ανήκει στην 16<sup>η</sup> ομάδα και στην 4<sup>η</sup> περίοδο

Το  $\Sigma_2$  ανήκει στην 13<sup>η</sup> ομάδα και στην 4<sup>η</sup> περίοδο

Το  $\Sigma_3$  ανήκει στην 16<sup>η</sup> ομάδα και στην 2<sup>η</sup> περίοδο

## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016

E 3.Χλ3Θ(α)

- β. Κατά μήκος μιας περιόδου του περιοδικού πίνακα η ατομική ακτίνα των στοιχείων ελαττώνεται από αριστερά προς τα δεξιά. Αυτό είναι συνέπεια της αύξησης του ατομικού αριθμού, οπότε και του δραστικού πυρηνικού φορτίου των ατόμων άρα και της ισχυρότερης έλξης των ηλεκτρονίων της εξωτερικής στιβάδας από τον πυρήνα.

Όταν μεγαλώνει η ατομική ακτίνα, αυξάνει και η μέση απόσταση του πιο μακρινού ηλεκτρονίου από τον πυρήνα, οπότε ελαττώνεται η έλξη του ηλεκτρονίου από τον πυρήνα με αποτέλεσμα να μειώνεται η ενέργεια ιοντισμού. Από τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι:

Το  $\Sigma_1$  έχει μεγαλύτερη ενέργεια ιοντισμού από το  $\Sigma_2$ , γιατί βρίσκεται πιο δεξιά στην ίδια περίοδο:  $E_{i,1}(\Sigma_1) > E_{i,1}(\Sigma_2)$

Το  $\Sigma_3$  έχει μεγαλύτερη ενέργεια ιοντισμού από το  $\Sigma_1$ , γιατί βρίσκεται πιο πάνω στην ίδια ομάδα:  $E_{i,1}(\Sigma_3) > E_{i,1}(\Sigma_1)$

Τελικά έχουμε:  $E_{i,1}(\Sigma_2) < E_{i,1}(\Sigma_1) < E_{i,1}(\Sigma_3)$

## ΘΕΜΑ Γ

Γ.1 α.

A: CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> OH	B: CH <sub>3</sub> CH=O	C: CH <sub>3</sub> COOH
Δ: CH <sub>3</sub> COOCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	E: CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> Cl	Z: HCOONa
Θ: CH <sub>3</sub> CH <sub>2</sub> CN	Δ: HCOOCH <sub>2</sub> CH <sub>3</sub>	

β. Στην ένωση Θ που έχει συντακτικό τύπο CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>C≡N το άτομο άνθρακα που ενώνεται με το άτομο αζώτου (τριπλός δεσμός), έχει υβριδισμό sp<sup>3</sup>. Τα άλλα δύο άτομα άνθρακα, έχουν υβριδισμό sp<sup>2</sup>.

Γ.2 Τα ισομερή αλκυλοβρωμίδια με τύπο C<sub>3</sub>H<sub>7</sub>Br είναι δύο: Το CH<sub>3</sub>CH<sub>2</sub>CH<sub>2</sub>Br (προπυλοβρωμίδιο) και το CH<sub>3</sub>CH(Br)CH<sub>3</sub> (ισοπροπυλοβρωμίδιο) με κοινή

$$Mr = 3 \cdot 12 + 7 \cdot 1 + 80 = 123$$

Έστω ότι έχουμε x mol από το κάθε ένα, αφού το μείγμα είναι ισομοριακό.

$$\begin{aligned} m_{\text{μείγμ}} &= m_1 + m_2 = n_1 \cdot Mr_1 + n_2 \cdot Mr_2 = 123x + 123x = 246x \Rightarrow \\ &\Rightarrow 24,6 = 246x \Rightarrow x = 0,1 \text{ mol} \end{aligned}$$

Αντιδρούν και τα δύο αλκυλοβρωμίδια με υδατικό διάλυμα NaOH ως εξής:

# ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016

## E 3.Xλ3Θ(α)




Οι ενώσεις που παράγονται, είναι οι αντίστοιχες αλκοόλες που αποτελούν το μείγμα  $M_2$ . Αφού το μείγμα  $M_2$  χωρίζεται σε δύο ίσα μέρη, το κάθε μέρος θα περιέχει 0,05 mol από την καθεμία αλκοόλη.

a. Και οι δύο αλκοόλες οξειδώνονται από  $K_2Cr_2O_7$  ως εξής:



Αντιδρούν  $0,05 \text{ mol} \text{CH}_3\text{CH}_2\text{CH}_2\text{OH}$  με  $\frac{0,1}{3} \text{ mol K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$





Αντιδρούν  $0,05 \text{ mol} \text{CH}_3\text{CH(OH)CH}_3$  με  $\frac{0,05}{3} \text{ mol K}_2\text{Cr}_2\text{O}_7$

Τα συνολικά μολύβδου  $K_2Cr_2O_7$  που απαιτούνται για την πλήρη οξείδωση του πρώτου μέρους, είναι:

$$n_{\text{axiom}} = \frac{0,1}{3} + \frac{0,05}{3} = 0,05 \text{ mol } c = \frac{n}{V} \Rightarrow V = \frac{n}{c} = \frac{0,05}{0,2} \Rightarrow V = 0,25 \text{ L} \quad \dot{\eta} \quad 250 \text{ mL}$$

β. Κατά τη θέρμανση του δεύτερου μέρους με Cu παράγονται οι αντίστοιχες καρβογυλικές ενώσεις:




## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016

E.3.Χλ3Θ(α)

Το μείγμα  $M_3$  που προκύπτει, περιέχει την προπανάλη και την προπανόνη.

Από τις δύο αυτές ενώσεις, μόνο η προπανάλη ανάγει το φελλίγελο υγρό και δίνει ίζημα  $Cu_2O$ , ως εξής:



Αντιδρούν 0,05 mol  $CH_3CH_2CH=O$  και παράγονται 0,05 mol  $Cu_2O$

Άρα προκύπτουν 0,05 mol  $Cu_2O$

### ΘΕΜΑ Δ

**Δ1.** Η αντίδραση που πραγματοποιείται, φαίνεται παρακάτω:



Το αέριο που παράγεται είναι το  $N_2$ :  $\frac{n_{N_2}}{n} = \frac{V}{V_m} = \frac{2,24}{22,4} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{n}{2} = 0,1 \Rightarrow n = 0,2 \text{ mol}$$

a. Το στερεό που παράγεται είναι το  $Cu$ :  $n_{Cu} = \frac{3n}{2} = \frac{3 \cdot 0,2}{2} \Rightarrow n_{Cu} = 0,3 \text{ mol}$


β. Τα mol της  $NH_3$  που αντέδρασαν είναι  $n$ , όπως φαίνεται παραπάνω.

Άρα αντέδρασαν:  $n_{NH_3} = 0,2 \text{ mol}$


**Δ2. Το διάλυμα Y1 περιέχει  $\text{NH}_3$  συγκέντρωσης  $C = n/V = 0,2 \text{ mol/L}$**

V L δ. HCl C M Y2	+	V L δ. $\text{NH}_4\text{Cl}$ C M Y3	→	2V L δ. HCl $C_{\text{HCl}} = C/2 \text{ M}$ δ. $\text{NH}_4\text{Cl} C_{\text{NH}_4\text{Cl}} = C/2 \text{ M}$
-------------------------	---	--	---	---

Ο ιοντισμός του ισχυρού οξέος HCl έχει ως εξής



Το  $\text{NH}_4\text{Cl}$  διίσταται ως εξής



Το ιόν του  $\text{NH}_4^+$  αντιστρέφεται με το  $\text{H}_2\text{O}$  υπό την επίδραση κοινού ιόντος  $\text{H}_3\text{O}^+$  από τον ιοντισμό του HCl

mol/L	$\text{NH}_4^+$	$\xrightleftharpoons{} \text{H}_2\text{O}$	$\text{NH}_3$	$\text{H}_3\text{O}^+$
αρχικά	C/2		-	C/2
ιοντίζονται	x		-	
παράγονται	-		x	x
τελικά	C/2-x		x	C/2 + x

$$\text{Ο βαθμός ιοντισμού του } \text{NH}_4^+ \text{ είναι } \alpha = \frac{n_{\text{ιοντ.}}(\text{NH}_4^+)}{n_{\text{αρχ.}}(\text{NH}_4^+)} \Rightarrow \alpha = \frac{x}{C} \quad (1)$$

## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016

E.3.Xλ3Θ(α)

$$\text{Για το ιόν } \text{NH}_4^+ \text{ ισχύει: } K_{\text{a}(\text{NH}_4^+)} = \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]} \Rightarrow K_{\text{a}} = \frac{x \cdot (x + \frac{C}{2})}{\frac{C}{2} - x} \quad \text{και από}$$

$$\text{τη σχέση (1) έχουμε: } K_{\text{a}} = a \cdot \frac{C}{2} \Rightarrow K_{\text{a}} = 10 K_{\text{a}} \cdot \frac{C}{2} \Rightarrow \\ \Rightarrow 1 = 5C \Rightarrow C = 0,2 \text{ M}$$

Η ποσότητα της  $\text{NH}_3$  που διαβιβάστηκε στο δοχείο A (0,2 mol), διαλύθηκε πλήρως στο νερό και δημιουργείται διάλυμα Y1 συγκέντρωσης C mol/L που όπως βρήκαμε είναι ίση με 0,2 mol.

$$\text{Άρα } C_{\text{NH}_3} = \frac{n_{\text{NH}_3}}{V} \Rightarrow V = \frac{0,2}{0,2} \Rightarrow V = 1 \text{ L}$$

V L		V L		2 V L
δ. $\text{NH}_3$	+	δ. $\text{HCl}$		δ. $\text{NH}_4\text{Cl}$
0,2 M		0,2 M		$C_{\text{NH}_4\text{Cl}} = 0,2V/2V = 0,1 \text{ M}$
Y1		Y2		Y4

Έχω ανάμειξη με αντίδραση. Βρίσκω αρχικά τα mol του  $\text{HCl}$  και της  $\text{NH}_3$  και κάνω την αντίδραση.

mol	$\text{NH}_3$	$\text{HCl}$	$\rightarrow$	$\text{NH}_4\text{Cl}$
αρχικά	0,2V	0,2V		-
αντιδρούν	0,2V	0,2V		-
παραγούνται	-	-		0,2V
τελικά	0	0		0,2V

$$\text{Βρίσκω τη C του } \text{NH}_4\text{Cl}: C_{\text{NH}_4\text{Cl}} = \frac{n_{\text{NH}_4\text{Cl}}}{V} = \frac{0,2 \cdot V}{2 \cdot V} \Rightarrow C_{\text{NH}_4\text{Cl}} = 0,1 \text{ M}$$

Έχω πλέον ένα διάλυμα άλατος.

mol/L	$\text{NH}_4\text{Cl}$	$\rightarrow$	$\text{NH}_4^+$	$+$	$\text{Cl}^-$
αρχικά	0,1				
τελικά	-		0,1		0,1

## ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016

E.3.Xλ3Θ(α)

mol/L	$\text{NH}_4^+$	+	$\text{H}_2\text{O}$	$\rightleftharpoons$	$\text{NH}_3$	+	$\text{H}_3\text{O}^+$
αρχικά	0,1				-		
ιοντίζονται	$\psi$				-		
παράγονται	-				$\psi$		
τελικά	$0,1-\psi$				$\psi$		$\psi$

$$K_{a(\text{NH}_4^+)} = \frac{K_w}{K_{b(\text{NH}_3)}}$$

$$K_{a(\text{NH}_4^+)} \frac{[\text{NH}_3][\text{H}_3\text{O}^+]}{[\text{NH}_4^+]} = \frac{\psi^2}{0,1 - \psi} \approx \frac{\psi^2}{0,1} \Rightarrow \psi = \sqrt{0,1 \cdot K_a} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+]_4 = \sqrt{0,1 \cdot K_a} \quad (2)$$

VL δ. $\text{NH}_3$ 0,2 M Y1	+	VL δ. $\text{NH}_4\text{Cl}$ 0,2 M Y3	→	2VL δ. $\text{NH}_3$ $C_{\text{NH}_3} = 0,2V/2V = 0,1 \text{ M}$ δ. $\text{NH}_4\text{Cl}$ $C_{\text{NH}_4\text{Cl}} = 0,2V/2V = 0,1 \text{ M}$ Y5
------------------------------------	---	---	---	---

Για την  $\text{NH}_3$ :  $C_{\beta\alpha\sigma} = 0,1 \text{ M}$

Για το  $\text{NH}_4\text{Cl}$ :  $C_{\text{oξ}} = 0,1 \text{ M}$

Το παραπάνω σύστημα αποτελεί ένα Ρυθμιστικό Διάλυμα

Για το συζυγές ζεύγος  $\text{NH}_3 - \text{NH}_4^+$  ισχύει:  $K_{a(\text{NH}_4^+)} = \frac{K_w}{K_{b(\text{NH}_3)}}$

Αφού ισχύουν όι προσεγγίσεις, ισχύει η σχέση Henderson - Hasselbach

$$\begin{aligned} \text{pH}_5 &= \text{pK}_a + \log \frac{C_{\beta\alpha\sigma}}{C_{\text{oξέος}}} \Rightarrow \text{pH}_5 = \text{pK}_a + \log \frac{0,1}{0,1} \Rightarrow \text{pH}_5 = \text{pK}_a \Rightarrow \\ &\Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+]_5 = K_{a(\text{NH}_4^+)} \Rightarrow \frac{K_w}{[\text{OH}^-]_5} = \frac{K_w}{K_{b(\text{NH}_3)}} \Rightarrow [\text{OH}^-]_5 = K_{b(\text{NH}_3)} \quad (3) \end{aligned}$$

Ενορίζουμε ότι για τα διαλύματα Y4 και Y5 που παράγονται ισχύει ότι

$[\text{H}_3\text{O}^+]_4 = [\text{OH}^-]_5$  και από τη σχέση (3) έχουμε:  $[\text{H}_3\text{O}^+]_4 = K_{b(\text{NH}_3)}$

και από τη σχέση (2) βγαίνει ότι:  $\sqrt{0,1 \cdot K_a} = K_{b(\text{NH}_3)} \Rightarrow$

$$0,1 \cdot K_{a(\text{NH}_4^+)} = (K_{b(\text{NH}_3)})^2 \Rightarrow \frac{K_w}{K_{b(\text{NH}_3)}} \cdot 0,1 = (K_{b(\text{NH}_3)})^2 \Rightarrow \frac{10^{-14}}{K_{b(\text{NH}_3)}} \cdot 0,1 = (K_{b(\text{NH}_3)})^2 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow (K_{b(NH_3)})^3 = 10^{-15} \Rightarrow K_{b(NH_3)} = 10^{-5}$$

$$\text{για το συζυγές οξύ } NH_4^+ \text{ ισχύει: } K_{a(NH_4^+)} = \frac{K_w}{K_{b(NH_3)}} = \frac{10^{-14}}{10^{-5}} \Rightarrow K_{a(NH_4^+)} = 10^{-9}$$

#### Διάλυμα Y4


$$[H_3O^+]_4 = \psi = \sqrt{0,1 \cdot K_a} = \sqrt{0,1 \cdot 10^{-9}} = \sqrt{10^{-10}} = 10^{-5}$$

$$pH_4 = -\log[H_3O^+]_4 = -\log 10^{-5} \Rightarrow pH_4 = 5$$

#### Διάλυμα Y5

$$pH_5 = pK_a \Rightarrow pH_5 = -\log 10^{-9} \Rightarrow pH_5 = 9$$

Δ3.




$$\text{Είναι δεδομένο ότι } [OH^-] = 10^8 [H_3O^+]$$

$$\text{Γνωρίζουμε επίσης ότι } [H_3O^+] \cdot [OH^-] = K_w = 10^{-14} \Rightarrow 10^8 [H_3O^+]^2 = 10^{-14} \Rightarrow$$

$$[H_3O^+]^2 = \frac{10^{-14}}{10^8} = 10^{-22} \Rightarrow [H_3O^+] = 10^{-11} \text{ και } pH = -\log[H_3O^+] = -\log 10^{-11} = 11$$

ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ:

- i) Έστω ότι έχω πλήρη αντίδραση μεταξύ NaOH και



Έχω ανάμειξη με αντίδραση. Βρίσκω αρχικά  $\omega$  mol του NaOH και του NH<sub>4</sub>Cl και κάνω την αντίδραση.

mol	NH <sub>4</sub> Cl	+ NaOH	→	NH <sub>3</sub>	+ NaCl	+ H <sub>2</sub> O
αρχικά	0,2	0,2		-		
αντιδρούν	0,2	0,2				
παράγονται	-	-		0,2	0,2	
τελικά	0	0		0,2	0,2	

Τα ιόντα που παράγονται από τη διάσταση του NaCl δεν αντιδρούν με το νερό.

Βρίσκω τη συγκέντρωση της NH<sub>3</sub>:  $C=n/V=0,2/2=0,1\text{ M}$

Ένα τέτοιο διάλυμα NH<sub>3</sub> ιοντίζεται

mol/L	NH <sub>3</sub>	+ H <sub>2</sub> O	↔	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	+ OH <sup>-</sup>
αρχικά	0,1			-	
ιοντίζονται	ω			-	
παράγονται				ω	ω
τελικά	0,1-ω			ω	ω

$$K_{\text{NH}_3} = \frac{[\text{NH}_4^+][\text{OH}^-]}{[\text{NH}_3]} = \frac{\omega^2}{0,1-\omega} \approx \frac{\omega^2}{0,1} \Rightarrow 10^{-5} = \frac{\omega^2}{0,1} \Rightarrow \omega = \sqrt{10^{-6}} = 10^{-3}$$

$$\text{Άρα } [\text{OH}^-] = 10^{-3} \quad [\text{H}_3\text{O}^+] = \frac{K_w}{[\text{OH}^-]} = \frac{10^{-14}}{10^{-3}} \Rightarrow [\text{H}_3\text{O}^+] = 10^{-11}$$

$$\text{pH} = -\log[\text{H}_3\text{O}^+] = -\log 10^{-11} = 11$$

Το pH του διαλύματος που προκύπτει είναι ίσο με το επιθυμητό pH.

Άρα ο όγκος του διαλύματος NaOH που θα προσθέσω είναι 1L

	<b>ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Φ.Ε.) – ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ</b>
<b>ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 2016</b>	<b>E.3.Χλ3Θ(α)</b>

ii) Av n > 0,2

Έχουμε τελικά εκτός από NH<sub>3</sub> και περίσσεια ισχυρής βάσης άρα pH > 11 απορρίπτεται.

iii) Av n < 0,2

Έχουμε τελικά εκτός από NH<sub>3</sub> και περίσσεια NH<sub>4</sub>Cl άρα pH < 11 απορρίπτεται.

ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΣΗΝ ΕΚΠΙΣΗΣ  
ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ