

## ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ & ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ & ΕΠΑ.Λ. Β'

14 ΜΑΪΟΥ 2011

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

### **ΘΕΜΑ Α**

**A1.** Θεωρία, σελ. 152 σχολικού βιβλίου.

**A2.** Θεωρία σχολικού βιβλίου. Δύο ενδεχόμενα  $A$ ,  $B$  ενός δειγματικού χώρου  $\Omega$  λέγονται ασυμβίβαστα όταν  $A \cap B = \emptyset$ .

**A3.** Θεωρία, σελ. 65 σχολικού βιβλίου. Η σχετική συχνότητα  $f_i$  μιας τιμής  $x_i$  ενός δείγματος, προκύπτει από το λόγο  $f_i = \frac{v_i}{v}$ , όπου  $v$  είναι η συχνότητα της τιμής  $x_i$  προς το μέγεθος  $v$  του δείγματος. Έτσι, αν πολλαπλασιαστεί επί 100 εκφράζει την ποσοστιαία εμφάνιση της τιμής  $x_i$ , σε σχέση με το μέγεθος του δειγματος  $v$ .

**A4.** **a)**  $\Lambda$ , **b)**  $\Lambda$ , **c)**  $\Sigma$ , **d)**  $\Lambda$ , **e)**  $\Sigma$ .

### **ΘΕΜΑ Β**

**B1.** Έστω  $N(A)$ ,  $N(K)$ ,  $N(M)$  τα πλήθη αντίστοιχα των άσπρων ( $A$ ), κόκκινων ( $K$ ) και μαύρων ( $M$ ) σφαιρών. Επειδή  $P(M) = \frac{1}{4}$ , θα είναι:  $\frac{N(M)}{N(\Omega)} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow N(\Omega) = 4 \cdot N(M)$ .

Αφού  $64 < N(\Omega) < 72$  έπειται  $64 < 4N(M) < 72 \Leftrightarrow 16 < N(M) < 18$ . Αφού  $N(M)$  είναι φυσικός αριθμός, προκύπτει  $N(M) = 17$ .

Άρα  $N(\Omega) = 4 \cdot 17 = 68$ .

**B2.** Είναι  $A \cup K \cup M = \Omega$ , άρα  $P(A \cup K \cup M) = P(\Omega) = 1$  (l), με  $A \cap M = \emptyset$ ,  $A \cap K = \emptyset$ ,  $M \cap K = \emptyset$ , δηλαδή τα  $A$ ,  $K$ ,  $M$ , είναι ανά δύο ασυμβίβαστα.

Έτσι η (l) γράφεται  $P(A) + P(K) + P(M) = 1$ .

Προκύπτει έτσι  $\frac{1}{4} + 4\lambda^2 - 5\lambda + \frac{7}{4} = 1 \Leftrightarrow 4\lambda^2 - 5\lambda + 1 = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1 \text{ ή } \lambda = \frac{1}{4}$ .

• Για  $\lambda = 1$  προκύπτει  $P(A) = 4$ , οπότε η τιμή  $\lambda = 1$  απορρίπτεται διότι  $0 \leq P(A) \leq 1$ .

• Για  $\lambda = \frac{1}{4}$  προκύπτει  $P(A) = \frac{1}{4}$ ,  $P(K) = \frac{1}{2}$ ,  $P(M) = \frac{1}{4}$ . Άρα η τιμή  $\lambda = \frac{1}{4}$  είναι η ζητούμενη.

B3.  $P(M) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{N(M)}{N(\Omega)} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow N(M) = \frac{1}{4} \cdot N(\Omega) = \frac{1}{4} \cdot 68 = 17.$

Επίσης,  $P(A) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \frac{N(A)}{N(\Omega)} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow N(A) = \frac{1}{4} \cdot N(\Omega) = \frac{1}{4} \cdot 68 = 17.$

$P(K) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \frac{N(K)}{N(\Omega)} = \frac{1}{2} \Leftrightarrow N(K) = \frac{1}{2} N(\Omega) = \frac{1}{2} \cdot 68 = 34.$

- B4. Έστω A το ενδεχόμενο να επιλεγεί άσπρη σφαίρα και M το ενδεχόμενο να επιλεγεί μαύρη σφαίρα. Ζητείται η πιθανότητα του ενδεχομένου  $A \cup M$ . Επειδή τα A, M είναι ασυμβίβαστα, είναι:  $P(A \cup M) = P(A) + P(M) = \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{2}$

### ΘΕΜΑ Γ

- Γ1. Είναι:

$$\bar{x} = \sum_{i=1}^7 x_i f_i = 8 \cdot 0 + 10 \cdot 0,1 + 12 \cdot 0,2 + 14 \cdot \frac{y_\Delta}{100} + 16 \cdot \frac{y_E}{100} + 18 \cdot 0,1 + 20 \cdot 0$$

Επειδή είναι  $\bar{x} = 14,2$  και  $y_\Delta = y_E$  έπειτα

$$14,2 = 1 + 2,4 + 30 \frac{y_\Delta}{100} + 1,8 \Leftrightarrow 14,2 - 5,2 = 30 y_\Delta \Leftrightarrow \frac{y_\Delta}{100} = \frac{9}{30}.$$

Άρα:  $y_\Delta = y_E = 30$


2ος τρόπος:

Επειδή  $y_\Delta + y_E = 60$

και  $\Delta E // x'x$  είναι  $y_\Delta = y_E$ .

Έτσι προκύπτει  $y_\Delta = y_E = 30$ .

- Γ2. Είναι:



**Γ3.** Είναι:

[ - )	$x_i$	$f_i \%$
9 - 11	10	10
11 - 13	12	20
13 - 15	14	30
15 - 17	16	30
17 - 19	18	10
Σύνολο		100

**Γ4.** Σύμφωνα με τον πίνακα του ερωτήματος Γ3, το ποσοστό των πωλητών που θα λάβουν το επιπλέον εφάπαξ ποσό είναι 40%.

**Γ5.** Είναι  $v = 80$ , διότι το εμβαδόν που περικλείεται από το πολύγωνο συχνοτήτων και τον οριζόντιο άξονα είναι ίσο με το πλήθος  $v$  των μετρήσεων.  
Έτσι ο αριθμός των πωλητών που δικαιούνται το εφάπαξ ποσό, που αναφέρεται στο ερώτημα Γ4, είναι:  $80 \cdot 40\% = 32$ .

## ΘΕΜΑ Δ

**Δ1.** Η συνάρτηση  $f$  είναι παραγωγίσιμη στο  $R$  ως σύνθεση παραγωγίσιμων συναρτήσεων, με

$$f'(x) = \left[ e^{\frac{1}{3}x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5})} \right]' = e^{\frac{1}{3}x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5})} \left[ \frac{1}{3}(x^3 - \frac{11}{10}x^2 + \frac{2}{5}x) \right]' =$$

$$= e^{\frac{1}{3}x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5})} \left[ \frac{1}{3}(3x^2 - \frac{11}{5}x + \frac{2}{5}) \right] = e^{\frac{1}{3}x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5})} \left( x^2 - \frac{11}{15}x + \frac{2}{15} \right)$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow e^{\frac{1}{3}x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5})} \cdot \left( x^2 - \frac{11}{15}x + \frac{2}{15} \right) = 0 \Leftrightarrow (\text{αφού } e^{\frac{1}{3}x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5})} \neq 0 \quad \forall x \in R)$$

$$x^2 - \frac{11}{15}x + \frac{2}{15} = 0 \Leftrightarrow 15x^2 - 11x + 2 = 0 \Leftrightarrow x = \frac{1}{3} \quad \text{ή} \quad x = \frac{2}{5}.$$

Προκύπτει έτσι ο επόμενος πίνακας μεταβολών:

$x$	$(-\infty, \frac{1}{3})$	$\frac{1}{3}$	$(\frac{1}{3}, \frac{2}{5})$	$\frac{2}{5}$	$(\frac{2}{5}, +\infty)$
$f'$	+	0	-	0	+
$f$	↗	↓	↗	↓	↗

Επομένως η  $f$  είναι:

- γνησίως αύξουσα στο διάστημα  $\left(-\infty, \frac{1}{3}\right]$ ,
- γνησίως φθίνουσα στο διάστημα  $\left[\frac{1}{3}, \frac{2}{5}\right]$ ,
- γνησίως αύξουσα στο διάστημα  $\left[\frac{2}{5}, +\infty\right)$ .

**Δ2.** Η  $f$  σύμφωνα με το Δ1 παρουσιάζει:

- τ. μέγιστο στη θέση  $x_1 = \frac{1}{3}$
- τ. ελάχιστο στη θέση  $x_2 = \frac{2}{5}$ .

Είναι  $A \subseteq B$  áρα  $P(A) \leq P(B)$ , οπότε  $P(A) = \frac{1}{3}$  και  $P(B) = \frac{2}{5}$ .

Ακόμα, επειδή  $A \subseteq B \Rightarrow A \cap B = A$ .

Οπότε:

- $P(A \cap B) = P(A) = \frac{1}{3}$ .
- $P(A - B) = P(A) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} = 0$ .
- $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B) = \frac{1}{3} + \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{2}{5}$ .
- $P(B - A) = P(B) - P(A \cap B) = \frac{2}{5} - \frac{1}{3} = \frac{1}{15}$ .

**Δ3. a)**  $f(x) = h(x) \Leftrightarrow e^{\frac{1}{3}x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5})} = e^{\frac{1}{5}x(\frac{3x^2}{2} - x - \frac{1}{3})} \stackrel{e^x \text{ 1-1}}{\Leftrightarrow}$

$$\Leftrightarrow \frac{1}{3}x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5}) = \frac{1}{5}x(\frac{3x^2}{2} - x - \frac{1}{3}) \Leftrightarrow 5x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5}) = 3x(\frac{3x^2}{2} - x - \frac{1}{3}) \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow 5x(x^2 - \frac{11}{10}x + \frac{2}{5}) - 3x(\frac{3x^2}{2} - x - \frac{1}{3}) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x(5x^2 - \frac{11}{2}x + 2 - \frac{9x^2}{2} + 3x + 1) = 0 \Leftrightarrow$$

$$\Leftrightarrow x(\frac{1}{2}x^2 - \frac{5x}{2} + 3) = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 5x + 6) = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0, x_2 = 2, x_3 = 3.$$

β) Είναι:

- $v_1 = 2 \cdot x_1 + 1 = 2 \cdot 0 + 1 = 1.$
- $v_2 = 2 \cdot x_2 + 2 = 2 \cdot 2 + 1 = 5.$
- $v_3 = 2 \cdot x_3 + 2 = 2 \cdot 3 + 1 = 7.$

Έτσι προκύπτει ο παρακάτω πίνακας κατανομής συχνοτήτων:

$x_i$	$v_i$	$x_i v_i$
$x_1 = 0$	$v_1 = 1$	0
$x_2 = 2$	$v_2 = 5$	10
$x_3 = 3$	$v_3 = 7$	21
		$v = 13$

$$\text{Άρα } \bar{x} = \frac{0+10+21}{13} = \frac{31}{13}.$$